

EDITURA PARALELA 45



Redactare: Ramona Rossall, Iuliana Ene  
Tehnoredactare: Mioara Benza  
Pregătire de tipar: Marius Badea  
Design copertă: Marius Badea

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

**CHIRCIU, MARIN**

**Inegalități algebrice - 2 : de la inițiere la performanță /**

Marin Chirciu. - Pitești : Paralela 45, 2021

Conține bibliografie

ISBN 978-973-47-3212-8

512

**COMENZI – CARTEA PRIN POȘTĂ**

EDITURA PARALELA 45  
Bulevardul Republicii, Nr. 148, Clădirea C1, etaj 4, Pitești,  
jud. Argeș, cod 110177  
Tel.: 0248 633 130; 0753 040 444; 0721 247 918  
Tel./fax: 0248 214 533; 0248 631 439; 0248 631 492  
E-mail: [comenzi@edituraparelela45.ro](mailto:comenzi@edituraparelela45.ro)  
sau accesați [www.edituraparelela45.ro](http://www.edituraparelela45.ro)

Tiparul executat la tipografia *Editurii Paralela 45*

E-mail: [tipografie@edituraparelela45.ro](mailto:tipografie@edituraparelela45.ro)

Copyright © Editura Paralela 45, 2021

Prezenta lucrare folosește denumiri ce constituie mărci înregistrate,  
iar conținutul este protejat de legislația privind dreptul de proprietate intelectuală.  
[www.edituraparelela45.ro](http://www.edituraparelela45.ro)

Marin Chirciu

---

# INEGALITĂȚI ALGEBRICE 2

DE LA INIȚIERE LA PERFORMANȚĂ

---



Editura Paralela 45

## Cuprins

	Soluții
Capitolul 1 – Metoda SOS .....	7 ..... 106
Capitolul 2 – Inegalitatea mediilor .....	27 ..... 147
Capitolul 3 – Inegalitatea Cauchy–Schwarz .....	50 ..... 194
Capitolul 4 – Inegalitatea lui Hölder .....	73 ..... 239
Capitolul 5 – Inegalitatea lui Minkowski .....	85 ..... 266
Capitolul 6 – Inegalitatea lui Cebîșev .....	88 ..... 269
Capitolul 7 – Inegalitatea lui Schur .....	93 ..... 277
Capitolul 8 – Inegalitatea lui Jensen .....	97 ..... 285
<i>Bibliografie</i> .....	302

# capitolul

# 1

## Metoda SOS\*

„Dicționar: X = Eternul necunoscut  
Y = Praștia alfabetului.”  
Tudor Mușatescu

Sunt adevărate afirmațiile:

$$a^2 \geq 0, \forall a \in \mathbb{R}, \text{ cu egalitate pentru } a = 0.$$

$$(a-b)^2 \geq 0, \forall a, b \in \mathbb{R}, \text{ cu egalitate pentru } a = b.$$

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca, \forall a, b, c \in \mathbb{R}, \text{ cu egalitate pentru } a = b = c.$$

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca), \forall a, b, c \in \mathbb{R}, \text{ cu egalitate pentru } a = b = c.$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}, \text{ cu egalitate pentru } \Delta = 0 \text{ și } x = \frac{-b}{2a}.$$

$$a \leq x \leq b \Leftrightarrow (x-a)(x-b) \leq 0, \text{ cu egalitate dacă } x = a \text{ sau } x = b.$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca), \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc, \forall a, b, c \geq 0, \text{ cu egalitate pentru } a = b = c.$$

$$\frac{1}{(1+a)^2} + \frac{1}{(1+b)^2} \geq \frac{1}{1+ab}, \forall a, b > 0, \text{ cu } ab \geq 1.$$

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq a + b + c, \forall a, b, c > 0 \text{ și } abc = 1, \text{ cu egalitate pentru } a = b = c = 1.$$

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9, \forall a, b, c > 0, \text{ cu egalitate pentru } a = b = c.$$

$$a^3 + b^3 \geq ab(a+b), \forall a, b \geq 0, \text{ cu egalitate pentru } a = b.$$

$$\frac{a^3 + b^3}{a^2 + ab + b^2} \geq \frac{a+b}{3}, \forall a, b > 0, \text{ cu egalitate pentru } a = b.$$

$$\frac{a^3}{a^2 + ab + b^2} \geq \frac{2a-b}{3}, \forall a, b > 0, \text{ cu egalitate pentru } a = b.$$

$$\sqrt{a^2 + ab + b^2} \geq \frac{\sqrt{3}}{2}(a+b), \forall a, b \geq 0, \text{ cu egalitate pentru } a = b.$$

---

\* SOS method = Sum of Squares = sumă de pătrate

În continuare sunt propuse aplicații ce pot fi rezolvate folosind inegalitățile de mai sus.

**1.1.** Leme utile în rezolvarea unor inegalități:

a) Dacă  $a, b, c > 0$ , atunci  $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq \frac{9(a^2 + b^2 + c^2)}{(a+b+c)^2}$ .

b) Dacă  $a, b, c > 0$ , atunci  $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 3 + \frac{18(a^2 + b^2 + c^2)}{(a+b+c)^2}$ .

c) Fie  $a, b > 0$ . Arătați că:  $\sqrt[3]{\frac{a^3 + b^3}{2}} \leq \frac{a^2 + b^2}{a+b}$ .

d) Dacă  $a, b, c > 0$ , atunci  $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)^2 \geq (a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$ .

e) Dacă  $a, b, c > 0$  astfel încât  $abc = 1$ , arătați că:

$$\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq a^2 + b^2 + c^2.$$

f) Dacă  $a, b, c > 0$ , atunci  $\sum \frac{a^2}{b^2} \geq \frac{1}{2} \sum \frac{b+c}{a}$ .

g) Dacă  $a, b, c > 0$ , atunci  $\sum \frac{a^2}{b^2} \geq \frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{2abc} - 1$ .

h) Dacă  $a, b, c > 0$ , atunci  $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq 3\sqrt{\frac{a^4 + b^4 + c^4}{3}}$ .

**1.2.** a) Dacă  $x, y \geq 0$  și  $x + y = 2$ , arătați că  $x^2 y^2 (x^2 + y^2) \leq 2$ .

*Olimpiada Națională Irlanda, 2000*

b) Dacă  $x, y \geq 0$  astfel încât  $x + y = 2$  și  $n \in \mathbb{N}$ , atunci  $x^n y^n (x^2 + y^2) \leq 2$ .

*Dezvoltare, Marin Chirciu*

c) Dacă  $x, y \geq 0$  și  $x + y = 2$ , arătați că  $x^3 y^3 (x^3 + y^3) \leq 2$ .

*Olimpiada Națională India, 2008*

d) Dacă  $x, y \geq 0$  astfel încât  $x + y = 2$  și  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 3$ , atunci  $x^n y^n (x^3 + y^3) \leq 2$ .

*Dezvoltare, Marin Chirciu*

**1.3.** a) Demonstrați că pentru orice numere pozitive  $a, b, c$  cu suma  $a+b+c = \frac{3}{2}$  avem

inegalitatea:  $\frac{a}{1+4b^2} + \frac{b}{1+4c^2} + \frac{c}{1+4a^2} \geq \frac{3}{4}$ .

*GMB 3/2016, Vasile Mircea Popa, Sibiu*

b) Dacă  $a, b, c, n > 0$  și  $a + b + c = \frac{3}{n}$ , arătați că:

$$\frac{a}{1+n^2b^2} + \frac{b}{1+n^2c^2} + \frac{c}{1+n^2a^2} \geq \frac{3}{2n}.$$

1.4. a) Fie  $a, b, c$  numere reale pozitive cu suma 1. Demonstrați inegalitatea:

$$\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c} \geq \frac{2}{1+a} + \frac{2}{1+b} + \frac{2}{1+c}.$$

*All-Russian Olympiad, 2003*

b) Arătați că, dacă  $a, b, c, d$  sunt numere reale strict pozitive cu suma 1, atunci:

$$\frac{3}{1-a} + \frac{3}{1-b} + \frac{3}{1-c} + \frac{3}{1-d} \geq \frac{5}{1+a} + \frac{5}{1+b} + \frac{5}{1+c} + \frac{5}{1+d}.$$

*GM 11/2015, Supliment de exerciții, Daniel Sitaru, Drobeta-Turnu-Severin*

c) Fie  $a_1, a_2, \dots, a_n$  numere reale nenegative cu suma 1, unde  $n \geq 2$ . Arătați că:

$$(n-1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{1-a_k} \geq (n+1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+a_k}.$$

*Marin Chirciu și Octavian Stroe, Pitești*

1.5. a) Fie  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ . Arătați că pentru  $a_1, a_2, \dots, a_n \in (0, \sqrt{n}]$ , cu  $a_1 + a_2 + \dots + a_n = n$ , are loc următoarea inegalitate:

$$\frac{1}{a_1^2 + (a_2 + a_3 + \dots + a_n)} + \frac{1}{a_2^2 + (a_1 + a_3 + \dots + a_n)} + \dots + \frac{1}{a_n^2 + (a_1 + a_3 + \dots + a_{n-1})} \leq 1.$$

*GM 11/2016, Andra-Mălina Cardaș, elevă, Botoșani*

b) Dacă  $a, b, c > 0$  cu  $a + b + c = 3$ , arătați că:

$$\frac{1}{a^2 + b + c} + \frac{1}{b^2 + c + a} + \frac{1}{c^2 + a + b} \leq 1.$$

c) Dacă  $a, b, c > 0$  cu  $a + b + c = 3$ , arătați că:

$$\frac{1}{a^2 + k(b+c)} + \frac{1}{b^2 + k(c+a)} + \frac{1}{c^2 + k(a+b)} \leq \frac{3}{2k+1}, \text{ unde } 1 \leq k \leq 2.$$

d) Fie  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ . Arătați că pentru  $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ , cu  $a_1 + a_2 + \dots + a_n = n$ , are loc următoarea inegalitate:

$$\frac{1}{a_1^2 + k(a_2 + a_3 + \dots + a_n)} + \frac{1}{a_2^2 + k(a_1 + a_3 + \dots + a_n)} + \dots + \frac{1}{a_n^2 + k(a_1 + a_3 + \dots + a_{n-1})} \leq \frac{n}{1+k(n-1)}, \text{ unde } 1 \leq k \leq 2.$$

1.6. a) Fie  $a, b \geq 0$ , numere reale. Dacă  $\sqrt{a} \cdot |a-b| \leq 1$  și  $\sqrt{b} \cdot |4a-b| \leq 1$ , arătați că  $8a^3 + b^3 \leq 9$ .

*GM 1/2017, George Stoica, Canada*

- b) Fie  $a, b \geq 0$  și  $\lambda > 0$  numere reale. Dacă  $\sqrt{a} \cdot \left| a - \frac{2}{\lambda} \cdot b \right| \leq 1$  și  $\sqrt{b} \cdot |2\lambda \cdot a - b| \leq 1$ , arătați că  $(\lambda a)^3 + b^3 \leq \lambda^3 + 1$ .

*Dezvoltare, Marin Chirciu*

- 1.7. Fie  $a, b, c \in (0, \infty)$ , cu  $a + b + c = 3$ . Arătați că:

a)  $\frac{a}{a^2+2} + \frac{b}{b^2+2} + \frac{c}{c^2+2} \leq 1$ .

*RMT 2/2017, Marian Cucoaneș, Mărășești*

b)  $\frac{a}{a^2+n} + \frac{b}{b^2+n} + \frac{c}{c^2+n} \leq \frac{3}{n+1}$ , unde  $n \geq 1$ .

*Marin Chirciu*

- 1.8. Dacă  $a, b, c > 0$  și  $a + b + c = 3$ , arătați că:

a)  $\sum \frac{a^3 + b^3}{a^2 + ab + b^2} \geq 2$ .

*RMM 2017, Nguyen Viet Hung, Hanoi, Vietnam*

b)  $\sum \frac{a^3 + b^3}{a^2 + nab + b^2} \geq \frac{6}{n+2}$ , unde  $n \geq 0$ .

- 1.9. Să se arate că

$$\frac{1}{9a} + \frac{1}{9b} + \frac{10}{a+b} \geq \frac{121}{7} \left( \frac{1}{2a+5b} + \frac{1}{2b+5a} \right),$$

oricare ar fi numerele  $a, b > 0$ .

*GM 3/2017, Mihaela Berindeanu, București*

- 1.10. Să se demonstreze că, dacă  $x, y, z > 0$ , atunci este adevărată inegalitatea

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx + \frac{(x-y)^2 (y-z)^2 (z-x)^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

*Sclipirea Minții nr. XIX, 05/2017, Nela Ciceu și Roxana Mihaela Stanciu*

- 1.11. Fie  $a, b, c \in (0, \infty)$ . Să se demonstreze că:

a)  $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} + \frac{30abc}{(a+b)(b+c)(c+a)} \geq \frac{27}{4}$ .

*GM 5/2017, Costel Anghel, Slatina*

b)  $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} + n \cdot \frac{abc}{(a+b)(b+c)(c+a)} \geq 3 + \frac{n}{8}$ ,  $n \leq 32$ .

c)  $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} + \frac{32abc}{(a+b)(b+c)(c+a)} \geq 7$ .

*Dezvoltări, Marin Chirciu*



## capitolul

# 2

## Inegalitatea mediilor

„Între ceea ce este corect și  
ceea ce este greșit, alege  
ceea ce te face fericit.”

$$A_m \geq G_m : \quad \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad \forall a, b \geq 0.$$

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}, \quad \forall a, b, c \geq 0.$$

$$\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}, \quad \forall a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0.$$

$$A_m \geq G_m \geq H_m : \quad \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}, \quad \forall a, b > 0.$$

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \geq \frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}, \quad \forall a, b, c > 0.$$

$$\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}, \quad \forall a_1, a_2, \dots, a_n > 0.$$

$$Q_m \geq A_m : \quad \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

$$\max_{k=1, n} \{a_k\} \geq Q_m \geq A_m \geq G_m \geq H_m \geq \min_{k=1, n} \{a_k\}.$$

$$\max \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \geq \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \geq$$

$$\geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \geq \min \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

2.1. Dacă  $x, y, z > 0$  și  $x + y + z = 1$ , arătați că:

$$\text{a) } \left(1 + \frac{1}{x}\right)\left(1 + \frac{1}{y}\right)\left(1 + \frac{1}{z}\right) \geq 64. \quad \text{b) } \left(1 + \frac{2}{x}\right)\left(1 + \frac{2}{y}\right)\left(1 + \frac{2}{z}\right) \geq 343.$$

$$\text{c) } \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(y + \frac{1}{y}\right)\left(z + \frac{1}{z}\right) \geq \frac{1000}{27}. \quad \text{d) } \left(x + \frac{2}{x}\right)\left(y + \frac{2}{y}\right)\left(z + \frac{2}{z}\right) \geq \left(\frac{19}{3}\right)^3.$$

*Internet, Mathlinks, AoPS*

Dacă  $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$  și  $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$ , arătați că:

$$\text{a) } \left(1 + \frac{1}{x_1}\right)\left(1 + \frac{1}{x_2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{x_n}\right) \geq (1+n)^n.$$

$$\text{b) } \left(1 + \frac{k}{x_1}\right)\left(1 + \frac{k}{x_2}\right) \dots \left(1 + \frac{k}{x_n}\right) \geq (1+kn)^n, \quad k > 0.$$

$$\text{c) } \left(x_1 + \frac{1}{x_1}\right)\left(x_2 + \frac{1}{x_2}\right) \dots \left(x_n + \frac{1}{x_n}\right) \geq \left(n + \frac{1}{n}\right)^n.$$

$$\text{d) } \left(x_1 + \frac{k}{x_1}\right)\left(x_2 + \frac{k}{x_2}\right) \dots \left(x_n + \frac{k}{x_n}\right) \geq \left(kn + \frac{1}{n}\right)^n, \quad k \geq 1.$$

*Dezvoltări, Marin Chirciu*

2.2. a) Fie  $a, b, c$  numere reale pozitive cu  $abc = a + b + c + 2$ . Arătați că:

$$\frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2} + \sqrt[3]{c^2}}{2} \geq \frac{1}{\sqrt[3]{a}} + \frac{1}{\sqrt[3]{b}} + \frac{1}{\sqrt[3]{c}}.$$

*GM 9/2016, Marian Cucoaneș, Mărășești*

b) Fie  $a, b, c, d$  numere reale pozitive cu  $abcd = a + b + c + d + 8$ . Arătați că:

$$\frac{\sqrt[4]{a^3} + \sqrt[4]{b^3} + \sqrt[4]{c^3} + \sqrt[4]{d^3}}{2} \geq \frac{1}{\sqrt[4]{a}} + \frac{1}{\sqrt[4]{b}} + \frac{1}{\sqrt[4]{c}} + \frac{1}{\sqrt[4]{d}}.$$

c) Fie  $a_1, a_2, \dots, a_n$  numere reale pozitive cu  $a_1 a_2 \dots a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + 2^n - 2n$ , unde  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ . Arătați că:

$$\frac{\sqrt[n]{a_1^{n-1}} + \sqrt[n]{a_2^{n-1}} + \dots + \sqrt[n]{a_n^{n-1}}}{2} \geq \frac{1}{\sqrt[n]{a_1}} + \frac{1}{\sqrt[n]{a_2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}}.$$

*Dezvoltare, Marin Chirciu*

2.3. Fie  $a, b > 0$ . Demonstrați că:

$$\text{a) } 4 \leq \left(\frac{2ab}{a+b} + \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\right)\left(\frac{a+b}{2ab} + \sqrt{\frac{2}{a^2+b^2}}\right) \leq \frac{(a+b)^2}{ab}.$$

*AoPS, 23 decembrie 2016, Daniel Sitaru*

$$\text{b) } 4 \leq \left(\frac{2ab}{a+b} + \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\right)\left(\frac{a+b}{2ab} + \sqrt{\frac{2}{a^2+b^2}}\right) \leq 4 - 2n + n\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right), \text{ cu } n \geq \frac{1}{2}.$$

- c)  $4 \leq \left( \frac{a+b}{2} + \sqrt{ab} \right) \left( \frac{2}{a+b} + \frac{1}{\sqrt{ab}} \right) \leq 4 - 2n + n \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$ , cu  $n \geq \frac{1}{4}$ .
- d)  $4 \leq \left( \frac{a+b}{2} + \frac{2ab}{a+b} \right) \left( \frac{2}{a+b} + \frac{a+b}{2ab} \right) \leq 4 - 2n + n \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$ , cu  $n \geq \frac{1}{4}$ .
- e)  $4 \leq \left( \frac{a+b}{2} + \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \right) \left( \frac{2}{a+b} + \sqrt{\frac{2}{a^2+b^2}} \right) \leq 4 - 2n + n \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$ , cu  $n \geq \frac{1}{4}$ .
- f)  $4 \leq \left( \sqrt{ab} + \frac{2ab}{a+b} \right) \left( \frac{1}{\sqrt{ab}} + \frac{a+b}{2ab} \right) \leq 4 - 2n + n \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$ , cu  $n \geq \frac{1}{4}$ .
- g)  $4 \leq \left( \sqrt{ab} + \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \right) \left( \frac{1}{\sqrt{ab}} + \sqrt{\frac{2}{a^2+b^2}} \right) \leq 4 - 2n + n \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$ , cu  $n \geq \frac{1}{2}$ .

*Dezvoltări, Marin Chirciu*

**2.4.** a)  $9 \leq \left( \frac{2ab}{a+b} + \sqrt{ab} + \frac{a+b}{2} \right) \left( \frac{a+b}{2ab} + \frac{1}{\sqrt{ab}} + \frac{2}{a+b} \right) \leq 5 + 2 \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$ .

*AoPS, 23 decembrie 2016, Daniel Sitaru*

- b)  $9 \leq \left( \frac{2ab}{a+b} + \sqrt{ab} + \frac{a+b}{2} \right) \left( \frac{a+b}{2ab} + \frac{1}{\sqrt{ab}} + \frac{2}{a+b} \right) \leq 9 - 2n + n \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$ ,  $n \geq \frac{3}{4}$ .
- c)  $9 \leq \left( \frac{a+b}{2} + \sqrt{ab} + \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \right) \left( \frac{2}{a+b} + \frac{1}{\sqrt{ab}} + \sqrt{\frac{2}{a^2+b^2}} \right) \leq 9 - 2n + n \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$ ,  
cu  $n \geq \frac{3}{4}$ .
- d)  $9 \leq \left( \frac{a+b}{2} + \frac{2ab}{a+b} + \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \right) \left( \frac{2}{a+b} + \frac{a+b}{2ab} + \sqrt{\frac{2}{a^2+b^2}} \right) \leq 9 - 2n + n \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$ ,  
cu  $n \geq \frac{3}{4}$ .
- e)  $9 \leq \left( \sqrt{ab} + \frac{2ab}{a+b} + \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \right) \left( \frac{1}{\sqrt{ab}} + \frac{a+b}{2ab} + \sqrt{\frac{2}{a^2+b^2}} \right) \leq 9 - 2n + n \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$ ,  
cu  $n \geq \frac{5}{4}$ .

*Dezvoltări, Marin Chirciu*

**2.5.** a) Fie  $a, b, c, d > 0$  cu  $a + b + c + d = 1$ . Să se arate că  $\sum \frac{a^2 + b + c}{b + c + d} \geq 3$ .

*GM 12/2016, Marian Cucoaneș, Mărășești*

b) Fie  $a, b, c > 0$  cu  $a + b + c = 1$ . Să se arate că  $\sum \frac{a^2 + b}{b + c} \geq 2$ .

c) Fie  $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$  cu  $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$ . Să se arate că:

$$\sum \frac{a_1^2 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{a_2 + a_3 + \dots + a_n} \geq n - 1.$$

*Dezvoltare, Marin Chirciu*

**2.6.** Arătați că, dacă  $a, b, c > 0$ , atunci

$$a) \left(\frac{bc}{a}\right)^{\lg \frac{b}{c}} + \left(\frac{ca}{b}\right)^{\lg \frac{c}{a}} + \left(\frac{ab}{c}\right)^{\lg \frac{a}{b}} \geq 3.$$

*RMT 1/2017, Gheorghe Stoica, Petroșani*

$$b) \left(\frac{bc}{na}\right)^{\lg \frac{b}{c}} + \left(\frac{ca}{nb}\right)^{\lg \frac{c}{a}} + \left(\frac{ab}{nc}\right)^{\lg \frac{a}{b}} \geq 3, \text{ unde } n > 0.$$

*Dezvoltare, Marin Chirciu*

**2.7.** a) Fie  $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$  și numere reale pozitive  $a_1, a_2, \dots, a_n$  astfel încât  $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n = \sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \dots \cdot \sqrt[n]{n}$ . Să se arate că:

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

și să se determine cazurile de egalitate.

*GM 1/2017, Dorlir Ahmenti, Albania*

b) Fie numerele reale pozitive  $a_1, a_2, \dots, a_n$  astfel încât  $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n = \sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \dots \cdot \sqrt[n]{n}$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ . Să se arate că:

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_n} \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

și să se determine cazurile de egalitate.

**2.8.** Arătați că pentru orice numere reale  $a, b, c > 0$ , cu  $abc = 1$  sunt adevărate relațiile:

$$a) \frac{1}{a^5 + b^5 + ab} + \frac{1}{b^5 + c^5 + bc} + \frac{1}{c^5 + a^5 + ca} \leq \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}.$$

*GM 10/2016, Daniela Vlaicu, Zalău*

$$b) \sum \frac{1}{b^{2n+3} + c^{2n+3} + (bc)^{3-2n}} \leq \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}, \text{ unde } n \in \mathbb{N}^*.$$

Când au loc egalitățile?

*Marin Chirciu*

**2.9.** Fie  $a, b, c > 0$  numere reale pozitive cu proprietatea că  $a + b + c = 1$ . Arătați că:

$$a) \sqrt{3a^2 + 4ab + b^2} + \sqrt{3b^2 + 4bc + c^2} + \sqrt{3c^2 + 4ca + a^2} \leq 2\sqrt{2}.$$

*GM 2/2017, Ovidiu Bobb, Copalnic-Mănăștur, Maramureș*

„Învață regulile ca să știi  
cum să le încalci.”

Dalai Lama

### Inegalitatea lui Bergström (Cauchy–Schwarz) (CS)

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \quad x, y > 0 \text{ (Titu Andreescu).}$$

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{(a+b+c)^2}{x+y+z}, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}, \quad x, y, z > 0.$$

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} \geq \frac{(a+b+c)^2}{ax+by+cz}, \quad \forall a, b, c, x, y, z > 0.$$

$$\frac{a_1^2}{x_1} + \frac{a_2^2}{x_2} + \dots + \frac{a_n^2}{x_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}, \quad \forall a_i \in \mathbb{R}, \quad x_i > 0, \quad i = \overline{1, n}.$$

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}, \quad \forall a, b, c > 0 \text{ (Nesbitt).}$$

$$\frac{a}{b+nc} + \frac{b}{c+na} + \frac{c}{a+nb} \geq \frac{3}{n+1}, \quad \forall a, b, c > 0, \quad n \geq 0.$$

### Inegalitatea Cauchy–Buniakovski–Schwarz (CBS)

$$(ax+by)^2 \leq (a^2+b^2)(x^2+y^2), \quad \forall a, b, x, y \in \mathbb{R}.$$

$$(ax+by+cz)^2 \leq (a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2), \quad \forall a, b, c, x, y, z \in \mathbb{R}.$$

$$(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2), \quad \forall a_i, x_i \in \mathbb{R}, \quad i = \overline{1, n}.$$

### Cazuri particulare din inegalitatea lui Hölder

$$\frac{a^3}{x} + \frac{b^3}{y} + \frac{c^3}{z} \geq \frac{(a+b+c)^3}{3(x+y+z)}, \quad \forall a, b, c, x, y, z > 0.$$

$$\frac{a^4}{x} + \frac{b^4}{y} + \frac{c^4}{z} \geq \frac{(a+b+c)^4}{9(x+y+z)}, \quad \forall a, b, c, x, y, z > 0.$$

$$\frac{a^n}{x} + \frac{b^n}{y} + \frac{c^n}{z} \geq \frac{(a+b+c)^n}{3^{n-2}(x+y+z)}, \quad \forall a, b, c, x, y, z > 0, n \geq 2, n \in \mathbb{N}.$$

$$\frac{a^n}{x} + \frac{b^n}{y} \geq \frac{(a+b)^n}{2^{n-2}(x+y)}, \quad \forall a, b, x, y > 0, n \geq 2, n \in \mathbb{N}.$$

**3.1.** a) Numerele reale  $a, b, c, d$  verifică  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 4$ . Arătați că:

$$a^4 + b^4 + c^4 + d^4 + 4(a+b+c+d)^2 \leq 68.$$

*GMB 2/2016, Ion Nedelcu*

b) Numerele reale  $a_1, a_2, \dots, a_k$  verifică  $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_k^2 = k, k \geq 2$ . Arătați că:

$$a_1^4 + a_2^4 + \dots + a_k^4 + n(a_1 + a_2 + \dots + a_k)^2 \leq nk^2 + k, \text{ unde } n \geq 2.$$

*GMB 9/2016, Marin Chirciu*

**3.2.** Dacă  $a, b, c > 0$  și  $abc = 1$ , demonstrați că au loc inegalitățile:

$$\text{a) } \sum \frac{1}{(a+1)(a+2)} \geq \frac{1}{2}.$$

*AoPS 7/2016*

$$\text{b) } \sum \frac{1}{(a+n)(a+n+1)} \geq \frac{3}{(n+1)(n+2)}, \text{ unde } 0 \leq n \leq 1.$$

$$\text{c) } \sum \frac{1}{(a+1)(a+n)} \geq \frac{3}{2(n+1)}, \text{ unde } 0 \leq n \leq 2.$$

$$\text{d) } \sum \frac{1}{(a+n)(a+k)} \geq \frac{3}{(n+1)(k+1)}, \text{ unde } n, k \geq 0 \text{ și } 2nk \leq n+k+1.$$

*Dezvoltări, Marin Chirciu*

**3.3.** a) Numerele  $x, y, z \in (0, \infty)$  verifică  $xyz = xy + yz + zx$ . Să se demonstreze că:

$$\frac{xy}{z(1+xy)} + \frac{yz}{x(1+yz)} + \frac{zx}{y(1+zx)} \geq \frac{9}{10}.$$

*D.M. Bățineșu-Giurgiu, București și Neculai Stanciu, Buzău*

b) Dacă numerele  $a, b, c \in (0, \infty)$  verifică  $a+b+c=1$ , să se arate că:

$$\frac{a}{1+bc} + \frac{b}{1+ca} + \frac{c}{1+ab} \geq \frac{9}{10}.$$

c) Numerele  $x, y, z \in (0, \infty)$  verifică  $xyz = xy + yz + zx$ . Să se demonstreze că:

$$\frac{xy}{z(n+xy)} + \frac{yz}{x(n+yz)} + \frac{zx}{y(n+zx)} \geq \frac{9n}{9n+1}, \text{ unde } n \geq 0.$$

d) Dacă numerele  $a, b, c \in (0, \infty)$  verifică  $a+b+c=1$ , să se arate că:

$$\frac{a}{n+bc} + \frac{b}{n+ca} + \frac{c}{n+ab} \geq \frac{9n}{9n+1}, \text{ unde } n \geq 0.$$

*Dezvoltare, Marin Chirciu*

3.4. a) Se consideră numerele  $a, b, c \in (0, 1)$  sau  $a, b, c \in (0, \infty)$ . Notăm  $x = \log_a(bc)$ ,  $y = \log_b(ac)$ ,  $z = \log_c(ab)$ . Arătați că:

$$\sqrt{2(x+y+z)+6} \geq \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}.$$

*Problema 3, Concursul Gazeta Matematică și Viitorii Olimpici, 2017*

b) Se consideră numerele  $a, b, c, d \in (0, 1) \cup (1, \infty)$ . Notăm  $x = \log_a(bcd)$ ,  $y = \log_b(acd)$ ,  $z = \log_c(abd)$ ,  $t = \log_d(abc)$ . Arătați că:

$$\sqrt{3(x+y+z+t)+12} \geq \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} + \sqrt{t}.$$

*Problema 3, Concursul Gazeta Matematică și Viitorii Olimpici, 2017*

c) Se consideră numerele  $a_1, a_2, \dots, a_n \in (0, 1) \cup (1, \infty)$ . Notăm  $x_1 = \log_{a_1}(a_2 a_3 \dots a_n)$ ,  $x_2 = \log_{a_2}(a_1 a_3 \dots a_n)$ , ...,  $x_n = \log_{a_n}(a_1 a_2 \dots a_{n-1})$ . Arătați că:

$$\sqrt{(n-1)(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + n(n-1)} \geq \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} + \dots + \sqrt{x_n}.$$

3.5. Dacă  $a, b, c > 0$ , demonstrați că:

a)  $\log_{ab^3c^3} a + \log_{bc^3a^3} b + \log_{ca^3b^3} c \geq \frac{3}{7}$ . *RMT 1/2017, Florin Rotaru, Focșani*

b)  $\log_{ab^n c^n} a + \log_{bc^n a^n} b + \log_{ca^n b^n} c \geq \frac{3}{2n+1}$ , unde  $n \geq 1$ .

c)  $\log_{ab^n c^m} a + \log_{bc^n a^m} b + \log_{ca^n b^m} c \geq \frac{3}{n+m+1}$ , unde  $n \geq 0, m \geq 0, n+m \geq 2$ .

*Dezvoltări, Marin Chirciu*

3.6. a) Să se arate că, dacă  $x, y, z > 0$ , atunci:

$$\frac{1}{x^3+x+2} + \frac{1}{y^3+2y+2} + \frac{1}{z^3+3x+12} < \frac{7}{24} \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}}.$$

*Constantin Nicolau, Curtea de Argeș*

b) Inegalitatea poate fi extinsă la mai multe variabile. Să se arate că, dacă  $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ , atunci:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{x_1^3+x_1+2} + \frac{1}{x_2^3+2x_1+2} + \dots + \frac{1}{x_n^3+nx_1+n(n+1)} < \\ & < \frac{1}{4} \sqrt{\left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}\right) \left(\frac{1}{x_1^n} + \frac{1}{x_2^n} + \dots + \frac{1}{x_n^n}\right)}. \end{aligned}$$

3.7. a) Să se determine numerele reale  $x, y, z > \frac{3}{2}$  cu proprietatea că

$$\frac{(x+1)^2}{y+z-1} + \frac{(y+2)^2}{z+x-2} + \frac{(z+3)^2}{x+y-3} = 18.$$

*GM 2/2017, Alessandro Ventullo, Milano, Italia*